

生産計画書

- 1 農産物名(品種名) 水稻(早期:コシヒカリ)
- 2 栽培区分 特別栽培農産物(節減対象農薬5割以上減・化学肥料5割以上減)
- 3 適用地域(市町名) 西予市 宇和町
- 4 作型 水稻(早期:コシヒカリ)

作型	月											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
水稻(早期:コシヒカリ)				○	△				□			

○は播種 △は定植 □は収穫 ■は出荷

5-1 施肥管理計画

施用時期		減化学肥料栽培				栽培基準による10a当たり化学合成窒素成分量(kg/N)②	削減率(1-①/②×100)(%)
栽培ステージ	標準時期	使用資材名	10a当たり施用量(kg)	10a当たり窒素成分量(kg/N)	左記の化学合成窒素成分量(kg/N)①		
土作り	2月上旬～4月上旬	鉄強化美土里	60				
育苗(委託)	4月下旬～移植日	キセキ育苗(粒状)培土ライト	70	0.02	0.02		
育苗(自家)	4月下旬～移植日	キセキ育苗(粒状)培土	70	0.02	0.02		
基肥	5月上旬～5月中旬	水稻用エコ有機粒状278	20	2.40	1.19		
追肥	6月下旬～7月上旬	PKミックス	20	0.00	0.00		
穂肥	7月上旬～7月中旬	水稻用エコ有機粒状278	25	3.00	1.48		
計			265	5.44	2.71	6.0	54.83%

前作からの変更点無し

5-2 施肥管理計画

施用時期		減化学肥料栽培				栽培基準による10a当たり化学合成窒素成分量(kg/N)②	削減率(1-①/②×100)(%)
栽培ステージ	標準時期	使用資材名	10a当たり施用量(kg)	10a当たり窒素成分量(kg/N)	左記の化学合成窒素成分量(kg/N)①		
土作り	2月上旬～4月上旬	鉄強化美土里	60				
育苗(委託)	4月下旬～移植日	キセキ育苗(粒状)培土ライト	70	0.02	0.02		
育苗(自家)	4月下旬～移植日	キセキ育苗(粒状)培土	70	0.02	0.02		
基肥	5月上旬～5月中旬	有機入りセラコートR266	40	4.80	2.40		
追肥	6月下旬～7月上旬	PKミックス	20	0.00	0.00		
計			260	4.84	2.44	6.0	59.33%

前作からの変更点無し

6 病害虫・雑草防除計画

施用時期		減農薬栽培				栽培基準 による 10a当 たり農薬 使用 成分数 ②	削減率 (1-①/ ②×100) (%)
		対象病害虫 及び雑草防除	使用農薬名① (成分数)	使用基準	代替技術		
栽培 ステージ	標準時期						
種子消毒	4月上旬	シガレセンチュウ			種子更新		
	4月中旬	ばか苗病・いもち病 ・もみ枯細菌病 ・苗立枯病	テクリートCフロアブル (成分1剤)	希釈倍数200倍 使用時期浸種前 24時間種子浸漬 使用回数1回			
定植	5月上旬	いもち病 ・ウンカ類・ツマグロヨコバイ ・イネミスジウムシ	デジタルコラトップアクタ ラ箱粒剤 (成分2剤)	使用量50g/1箱 使用時期 移植前3日～ 移植当日 使用回数1回			
	5月上旬 ～中旬	水田1年生雑草 ・マツバイ・ホタルイ・ヘラオモダカ ・ミスガヤツリ・ウリカワ ・ヒルムシロ・セリ・クログワイ ・オモダカ・コウキヤガラ ※多年生イネ科雑草 ※①のみ	①カントダウ 1キロ粒剤 または ②カントダウ フロアブル (成分3剤)	使用量 ①1kg/10a・湛水散布 ②500ml/10a・原液湛水散 布 使用時期 ①②移植直後～ヒレ3葉期 (但し、移植後30日迄) 使用回数1回			
	1 6月上旬 ～中旬	水田1年生雑草 (イネ科を除く) ・マツバイ・ホタルイ ・ウリカワ・ミスガヤツリ ・ヘラオモダカ ・クログワイ・シズイ	①バサゲラン粒剤 または ②バサゲラン液剤 (成分1剤)	使用量 ①3～4kg/10a ②500～700ml/10a 使用時期 ①移植後15日～55日(但し、 収穫60日前まで) 使用回数1回 ②移植後15日～55日(但し、 収穫50日前まで) 使用回数2回以内 落水散布又はごく浅く湛水 して散布			
	2 6月上旬 ～中旬	ノビエ キシユウスズメノヒ エ アゼガヤ	①クンチャー1キロ粒剤 または ②クンチャーEW または ③クンチャージャンボ (成分1剤)	使用量 ①1kg/10a ②100ml/10a ③小包装20個/10a 使用時期 ①移植後7日～ヒレ4葉期 (但し、収穫30日前まで) 使用回数2回以内、湛水散 布 ②移植後20日ヒレ6葉期(但 し、収穫30日前まで) 使用回数2回以内 ③移植後7日～ヒレ4葉期 (但し、収穫30日前まで) 水田に小包装のまま投げ入 れる、使用回数2回以内		1 または 2 または 3	
～							

	3 6月上旬 ～中旬	水田1年生雑草 (イネ科を除く) ・マツバイ・ホタルイ ・ウリカワ・ミズガヤ ツリ ・ヘラオモダカ ・セリ・クログワイ・シ ズイ・キシユウスズメ ノヒエ	クインチャーバースME液剤 (成分2剤)	使用量 1000ml/10a 使用時期 ①移植後15日～ヒエ5葉期 (但し、収穫50日前まで) 使用回数2回以内 落水散布又はごく浅く湛水 して散布		
	6月中旬～ 7月中旬 (出穂前)	畦畔雑草草刈り (耕種的雑草防除) いもち病・紋枯病 ・ウカ類・メイユウ ・ツマグロヨコバイ ・カメシ類				・畦畔の 草刈り、 疎植栽培 による健 全な稲作 り
	7月下旬 (出穂後)	ウカ類・カメシ類 ・ツマグロヨコバイ	スタークル液剤10 (成分1剤)	無人ヘリ防除 希釈倍数8倍 散布量 0.8ℓ/10a 使用時期 収穫7日前迄 使用回数3回以内		
収穫予 定8/20 ～9/20	9月上旬～ 9月中旬 9月下旬～	収穫 収穫後水田耕起 (耕種的雑草防除)				・秋口の 耕起によ る雑草種 子の除去 対策
	計		9成分			18成分 50.00%

前作からの変更点無し

7 その他資材

8 乾燥調整計画(米、麦、豆類及び茶で乾燥調整を行う場合に限る。)

乾燥調整 担当者	所属	東宇和農業協同組合 宇和営農生活センター
	職氏名	宇和カントリー所長 河野 竜二
	連絡先	西予市宇和町清沢1338-2 (TEL)0894-62-5231 (FAX)0894-62-5806
乾燥調整施設	施設名	J Aひがしうわ大規模乾燥調整貯蔵施設 (CE;カントリーエレベーター)
	所在地	西予市宇和町清沢1338-2 (TEL)0894-62-5231 (FAX)0894-62-5806
	施設名	J Aひがしうわ共同乾燥調整貯蔵施設 (RC;ライスセンター)
	所在地	西予市宇和町久枝 (TEL)0894-62-3600 (FAX)0894-62-3600

個人調整①	施設名	石田 一浩		
	所在地	西予市宇和町田苗真土1079		
個人調整②	施設名	福井 順一		
	所在地	西予市宇和町田苗真土1290		
実施時期		原材料数量(kg)	乾燥調整後の 見込み数量(kg)	歩留(%)
令和3年9月上旬 ～10月上旬		131,299	87,970	67.0